B

MADE IN GERMANY

Информация о товаре

Лебозол® Бор-Н

Удобрение, соответствующее стандартам ЕС

ρ 1,37 | pH 8,0

Питательное вещество, массовая доля	**г / л**
10,7 % водорастворимого бора (B)	147
0,67 % Азот (N)	9
также содержит: 4,2 % суммарная массовая доля натрия (60 г/л Na)	

Культура	**Цель/Проблема**	**Рекомендации**	**Время применения**
In allen Kulturen	Для обеспечения бором	0,5 - 3 l/ha (With foliar fertilizer in 200 - 400 l water. Upon application with backpack sprayer 0.5%.)	При необходимости
In allen Kulturen	Для снабжения бором, транспортировки кальция, повышения качества пыльцы, цветения и плодов, урожайности, эффективности фотосинтеза	Fertigation	Обратитесь к региональному консультанту!
	Восстановление, накопление резервных веществ, зимостойкость	2 times 1 l/ha	С середины августа
In allen Kulturen	Для снабжения бором, транспортировки кальция, повышения качества пыльцы, цветения и плодов, урожайности, эффективности фотосинтеза	0,5 - 3 l/ha (Bei Blattdüngung in 200 - 400 l Wasser. Bei Applikation mit Rückenspritze 0,5%ig.)	При необходимости
In allen Kulturen	Повышение жизнестойкости (например, при заморозках в период цветения)	1 - 2 mal 2 l/ha (Beste Wirkung in Kombination mit 2 l/ha Aminosol® + 5 l/ha Lebosol®-Kalium 450)	При необходимости
	Восстановление, накопление резервных веществ, зимостойкость	2 раза 1 л/га	С середины августа
Озимые/яровые зерновые культуры	Эффективность использования азота, устойчивость стебля, качество семенного материала, зимостойкость	1 - 2 mal 0,5 - 1 l/ha	Со стадии 3-х листьев
Озимые/яровые зерновые культуры	Урожайность, качество	1 - 2 times 0,5 - 1 l/ha	Со стадии 3-х листьев и до конца кущения
Пастбища	Урожайность, качество	1 - 4 times 0,5 - 1 l/ha	Весной с начала вегетации
Пастбища	Эффективность использования азота, жизнестойкость, устойчивость стебля, зимостойкость	1 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha	В течение вегетационного периода
Картофель	Эффективность использования азота, внутреннее качество, прочность кожуры	1 - 3 mal 1 l/ha	Начиная со стадии 6-ти листьев
Картофель	Внутреннее качество	1 - 2 times 1 l/ha	Сначала смыкания рядков

Культура	Цель/Проблема	Рекомендации	Время применения
Бобовые (включая сою)	цветение, завязь плодов	2 times 1 l/ha	Начиная со стадии 6-ти листьев
Бобовые (включая сою)	Завязывание плодов, эффективность использования азота, повышение жизнестойкости (например, в холодном климате), увеличение содержания протеина	2 mal 1 l/ha	Начиная со стадии 6-ти листьев
Кукуруза	Энергитическая плотность, натура зерна, урожайность зерновых, качество пыльцы	2 l/ha	Начиная со стадии 4-х листьев
Кукуруза	Плотность энергии, эффективность использования азота, повышение жизнестойкости (например, в холодном климате)	1 - 2 mal 2 l/ha	Начиная со стадии 4-х листьев
Масличный рапс	Устойчивость стебля, прочность стручков, эффективность использования азота, зимостойкость, равномерное созревание, содержание масла	2 - 4 mal 2 - 3 l/ha	Начиная со стадии 4-х листьев
Масличный рапс	Равномерное цветение и созревание, урожайность	1 - 2 times 2 - 3 l/ha	Весной с начала вегетации и до начала цветения
Масличный рапс	Равномерное цветение и созревание, урожайность, зимостойкость	2 - 3 l/ha	Осенью начиная со стадии 4-х листьев
Подсолнухи	Урожайность, качество пыльцы	2 l/ha	Начиная со стадии 4-х листьев
Подсолнухи	Устойчивость стебля, эффективность использования азота, повышение жизнестойкости (например, в холодном климате), равномерное созревание, содержание масла	1 - 2 mal 2 l/ha	Начиная со стадии 4-х листьев
Сахарная свекла	Качество, урожайность, для предотвращения сердцевинной и сухой гнили	1 - 2 times 2 - 3 l/ha	Начиная со стадии 6-ти листьев
Сахарная свекла	Эффективность использования азота, повышение жизнестойкости (например, в холодном климате), устойчивость к сердцевинной и сухой гнили, содержание сахара	1 - 3 mal 2 - 3 l/ha	Начиная со стадии 6-ти листьев
Садовая земляника (клубника)	Развитие цветочных бутонов, качество цветков, зимостойкость	2 l/ha	Осенью (для новых растений)
Садовая земляника (клубника)	Качество растений при производстве семян: сильные растения, формирования столонов	2 mal 1 l/ha	За 14 и 7 дней до пересадки молодых растений
Садовая земляника (клубника)	Против деформации ягод, содержание сахара, количество цветочных почек, зимостойкость	1 - 3 mal 1 - 2 l/ha	Начиная с появления зеленых почек
Садовая земляника (клубника)	Качество растений при производстве семян: сильные растения, формирования столонов	2 times 1 l/ha	За 14 и 7 дней до пересадки молодых растений
Садовая земляника (клубника)	Для предотвращения деформированных ягод, цветение, завязь плодов	1 - 2 times 1 l/ha	Начиная с появления зеленых почек
Семечковые фрукты	Завязывание плодов, качество кожуры, количество цветочных почек, зимостойкость	2 - 4 mal 1 l/ha	Красные бутоны
Семечковые фрукты	Цветение, транспортировка кальция, завязь плодов, развитие пыльцевых трубок, качество кожуры	1 - 2 times 1 l/ha (and 1 - 2 times 1 l/ha from walnut size)	С момента появления розового цвета бутона до начала цветения
Косточковые фрукты	Завязывание плодов, качество кожуры, количество цветочных почек, зимостойкость	2 - 3 mal 1 l/ha	С момента формирования завязей плодов
Косточковые фрукты	цветение, завязь плодов	1 - 2 times 1 l/ha	С начала цветения
Кустарниковые ягоды	цветение, завязь плодов	1 - 2 times 1 l/ha	Перед цветением

Культура	Цель/Проблема	Рекомендации	Время применения
Кустарниковые ягоды	Завязывание плодов, качество кожуры, количество цветочных почек, зимостойкость	1 - 3 mal 1 l/ha	Начало роста побегов
Столовый виноград	Завязывание плодов, качество кожуры, количество цветочных почек, зимостойкость, равномерное созревание	2 - 3 раза 1 л/га	С момента увеличения завязи
Столовый виноград	Равномерное созревание, цветение, завязь плодов	2 times 1 l/ha	С фазы увеличения соцветий и до начала цветения
Цитрусовые плоды	Завязывание плодов, качество кожуры, количество цветочных почек, зимостойкость	2 - 4 mal 1 l/ha	С момента появления белых бутонов
Общее выращивание фруктов	Накопление резервных веществ, восстановление, зимостойкость, качество цветков	2 times 1 l/ha	После урожая
Виноград винных сортов	Завязывание плодов, качество кожуры, количество цветочных почек, зимостойкость, равномерное созревание	2 - 3 mal 1 l/ha	С момента увеличения завязи
Виноград винных сортов	Равномерное созревание, цветение, завязь плодов	2 times 1 l/ha	С фазы увеличения соцветий и до начала цветения
Плодовые овощи	цветение, завязь плодов	1 - 2 times 2 l/ha	До цветения при развитии достаточного количества листовой массы
Капуста, листовые овощи и луковичные овощи	Для предотвращения сердцевинной гнили на капусте, салате и прочих, внутреннее качество	2 - 3 times 2 - 3 l/ha	После развития достотчного количества листвы
Спаржа	Качество (трещины, полые стебли, качество кожуры)	2 - 3 times 2 - 3 l/ha	После развития достотчного количества листвы
Корнеплоды и клубнеплоды	Качество (трещины, полые стебли, изменение цвета внутри на коричневый)	2 - 3 times 2 - 3 l/ha	После развития достотчного количества листвы
Медицинские растения, душистые растения, специи	Урожайность, качество	1 - 2 times 2 - 3 l/ha	После развития достотчного количества листвы
Медицинские растения, душистые растения, специи	Качество листьев, устойчивость стебля, эффективность использования азота, жизнестойкость (например, в холодном климате), равномерное созревание, содержание масла	2 - 4 раза 1 - 3 л/га	После развития достотчного количества листвы
Общие овощи	Качество листьев, устойчивость стебля, эффективность использования азота, жизнестойкость (например, в холодном климате), равномерное созревание, содержание масла	2 - 4 раза 1 - 3 л/га	После развития достотчного количества листвы
Хмель	Развитие бутонов и столонов, качество	3 - 5 раза 1 - 2 л/га	С момента достижения высоты 0,5 м до сбора урожая
Хмель	Развитие бутонов и столонов, качество	3 - 5 times 1 - 2 l/ha	С момента достижения растением высоты 0.5 м и до начала цветения
Табак	Эффективность использования азота, жизнестойкость, качество листьев	1 - 3 раза 1 - 2 л/га	Начиная со стадии 4-х листьев
Рождественская ель	Качество игл, эффективность использования азота, жизнестойкость, зимостойкость	1 - 2 раза 1 л/га	Начиная со стадии 4-х листьев
Декоративные растения	Урожайность, качество	1 - 2 times 1 l/ha	После развития достотчного количества листвы
Декоративные растения	Эффективность использования азота, жизнестойкость, качество листьев	1 - 2 раза 1 л/га	После развития достотчного количества листвы
Зелень	Эффективность использования азота, жизнестойкость, устойчивость стебля, морозоустойчивость	1 - 4 пъти 0,5 - 1 л/га	В течение вегетационного периода

Культура	Цель/Проблема	Рекомендации	Время применения
Орехи	Завязывание плодов, качество кожуры, количество цветочных почек, зимостойкость	1 - 3 mal 1 - 2 l/ha	Набухание почек
Хлопчатник	Завязывание плодов, Системы цветочных бутонов, зимостойкость	1 - 3 раза 1 - 2 л/га	С фазы появления почек
Рис	Эффективность использования азота, устойчивость стебля, качество семенного материала, повышение жизнестойкости (например, в холодном климате)	1 - 2 mal 0,5 - 0,75 l/ha	Со стадии 3-х листьев

Lebosol® Dünger GmbH | Wiesengasse 28 | 67471 Elmstein — Германия | +49 (0) 63 28/9 84 94-0 | info@lebosol.de | www.lebosol.ru