HeptaFe

MADE IN GERMANY

био перечислено

Информация о товаре

Л-экспресс® ГептаЖелезо

Удобрение, соответствующее стандартам ЕС | Железосодержащее удобрение с гептаглюконовой кислотой

ρ 1,25 | pH 4,0 - 5,0

Питательное вещество, массовая доля	г / л
4,3 % Железо (Fe)	54
0,9 % Азот (N)	11
1,3 % органических веществ (аминокислоты)	16

Pflanzen, die unzureichend mit Nährstoffen versorgt sind, sind anfälliger gegenüber Krankheiten. Blattdüngung gewährleistet eine effektive und schnelle Nährstoffversorgung.

Культура	Цель/Проблема	Рекомендации	Время применения
In allen Kulturen	Для обеспечения железом	3 - 7 л/га. Расход рабочей жидкости не менее 300 л/га. При использовании ранцевого опрыскивателя концентрация рабочего раствора 1% (раннее использование наиболее эффективно. Добавление 1 л/га Аминозола повышает смачивание)	При необходимости
	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	2 - 4 раза 3 - 7 л/га (по листу)	При необходимости
In allen Kulturen	Для подачи железа, повышение качества листьев, урожайности, содержания влаги, повышение эффективности фотосинтеза, вызванного высокими температурами	3 - 7 л/га (По листу с 300 л воды минимум. При использовании ранцевого опрыскивателя концентрация рабочего раствора 1%. Ранее использование наиболее эффективное!)	При необходимости
In allen Kulturen	Для подачи железа, повышение качества листьев, урожайности, содержания влаги, повышение эффективности фотосинтеза, вызванного высокими температурами	Фертигация	Обратитесь к региональному консультанту!
Кукуруза	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	1 - 3 раза 3 - 7 л/га	Начиная со стадии 4-х листьев
Садовая земляника (клубника)	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	2 - 6 раз 3 - 7 л/га (по листу)	Начиная с появления зеленых почек
Садовая земляника (клубника)	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	Для некорневого удобрения, неоднократное применение 5 - 7 л/га	Весной с начала вегетации
Садовая земляника (клубника)	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	For soil application/band treatment 300 - 400 мл (на 100 м ряда)	В феврале/марте

Культура	Цель/Проблема	Рекомендации	Время применения
Садовая земляника (клубника)	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	300 - 400 мл (Boden/Bandbehandlung (pro 100 m Reihe))	В феврале/марте
Семечковые фрукты	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	30 - 60 мл/дерево (über den Boden, im Gießverfahren)	В феврале/марте
Семечковые фрукты	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	Для некорневого удобрения 3 - 7 л/га	С фазы достижения бутона размера лесного ореха
Семечковые фрукты	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	For soil application 30 - 60 мл/дерево (in the irrigation procedure)	В феврале/марте
Семечковые фрукты	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	2 - 4 раза 3 - 7 л/га (по листу)	Красные бутоны
Косточковые фрукты	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	30 - 60 мл/дерево (über den Boden, im Gießverfahren)	В феврале/марте
Косточковые фрукты	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	2 - 4 раза 3 - 7 л/га (по листу)	С момента формирования завязей плодов
Косточковые фрукты	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	For soil application 30 - 60 мл/дерево (in the irrigation procedure)	В феврале/марте
Косточковые фрукты	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	Для некорневого удобрения 1-2 раза 3 - 7 л/га	С момента завязи и до урожая
Кустарниковые ягоды	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	2 - 4 раза 3 - 7 л/га (по листу)	Начало роста побегов
Кустарниковые ягоды	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	300 - 400 мл (Boden/Bandbehandlung pro 100 m Reihe)	В феврале/марте
Кустарниковые ягоды	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	Ленточное внесение 400 - 500 мл (на 100 м ряда)	В феврале/марте
Кустарниковые ягоды	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	For soil application numerous applications 3 - 7 л/га	Весной с начала вегетации
Столовый виноград	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	15 - 25 мл (в 1 л воды) (über den Boden Lanzen/Bandbehandlung je Stock)	В феврале/марте
Столовый виноград	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	For soil application Lances per cane: 15 - 20 ml (with 1 l water)	В феврале/марте
Столовый виноград	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	Ленточное внесение 20 - 30 мл/ирригационная трубка	В феврале/марте
Столовый виноград	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	2 - 6 раза 3 - 7 л/га	3-листовая стадия до сбора урожая
Столовый виноград	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	Для некорневого удобрения 3 - 7 л/га (не во время цветения)	Со стадии 3-х листьев
Цитрусовые плоды	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	2 - 6 раза 3 - 7 л/га	С момента появления белых бутонов
Цитрусовые плоды	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	40 - 80 мл/дерево (über den Boden, im Gießverfahren)	В феврале/марте
Виноград винных сортов	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	Для некорневого удобрения 3 - 7 л/га (не в течение цветения)	Со стадии 3-х листьев
Виноград винных сортов	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	For soil application Lances per cane: 15 - 20 ml (with 1 l water)	В феврале/марте
Виноград винных сортов	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	15 - 25 мл (на 1 л воды) (über den Boden Lanzen/Bandbehandlung je Stock)	В феврале/марте
Виноград винных сортов	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	2 - 6 раз 3 - 7 л/га	3-листовая стадия до сбора урожая
Виноград винных сортов	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	Ленточное внесение 20 - 30 мл/ирригационная трубка	В феврале/марте
Общие овощи	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	2 - 4 раза 3 - 7 л/га (по листу)	После развития достотчного количества листвы
Декоративные растения	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	For soil application 5 - 10 мл (с 1 л воды на 1м^2 или в фертигацию, максимум 400 мл на 1000 л воды)	В начале сбора урожая
Декоративные растения	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	5 - 10 мл (über den Boden, mit 1 l Wasser/m^2 oder bei Fertigation max. 500 ml in 1000 l Wasser)	При необходимости

Культура	Цель/Проблема	Рекомендации	Время применения
Декоративные растения	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	For foliar fertilisation 3 - 7 л/га (1 л на 100 л распрыскиваемой воды, не во время цветения)	При необходимости
Декоративные растения	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	3 - 7 л/га (по листу)	При необходимости
Зелень	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	2 - 6 раз 3 - 7 л/га (по листу, с 400 л воды минимум)	В течение вегетационного периода
Зелень	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	50 - 70 мл/100м^2 (über den Boden, in mindestens 4 l Wasser)	В течение вегетационного периода
Орехи	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	30 - 60 ml/Baum (über den Boden, im Gießverfahren)	В феврале/марте
Орехи	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	2 - 4 раза 3 - 7 л/га (по листу)	С момента формирования завязей плодов
Хлопчатник	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	2 - 4 раза 3 - 7 л/га	При необходимости
Рис	Предотвращение и уменьшение железистого хлороза	1 - 3 раза 3 - 7 л/га	Со стадии 3-х листьев