Mg

MADE IN GERMANY

био перечислено

Информация о товаре

Л-экспресс®Магний 400

Удобрение, соответствующее стандартам ЕС | Карбонатная суспензия

ρ 1,61 | pH 8,0 - 10,0

Питательное вещество, массовая доля	**г / л**
1,4 % Общий кальций (CaO)	20
25 % суммарная массовая доля оксида магния (MgO)	400
Minor constituents Meeresalgen, Neutralisationswert = 36	

Pflanzen, die unzureichend mit Nährstoffen versorgt sind, sind anfälliger gegenüber Krankheiten. Blattdüngung gewährleistet eine effektive und schnelle Nährstoffversorgung.

Культура	**Цель/Проблема**	**Рекомендации**	**Время применения**
In allen Kulturen	Для обеспечения магнием	3 - 5 л/га (для внекорневой подкормки в 200 л воды как минимум. При использовании ранцевого опрыскивателя концентрация рабочего раствора 1%)	При необходимости
	Эффективность использования азота, жизнестойкость, качество листьев	1 - 3 раза 3 - 5 л/га	В течение вегетационного периода
In allen Kulturen	Качество игл ("Nadelspitzenbrand"), характер роста ("форма маятника")	3 - 5 л/га (Для внекорневых подкормок на 200 л воды. При использовании ранцевого опрыскивателя концентрация рабочего раствора 1%)	При необходимости
	Для предотвращения преждевременного опадания листьев; повышенная жизнестойкость, качество листьев, уровень фотосинтеза	2 - 3 раза 3 - 5 л/га	В течение вегетационного периода
Озимые/яровые зерновые культуры	Качество листьев, урожайность, уровень фотосинтеза, жизнестойкость	1 - 2 раза 3 - 5 л/га	Весной с начала вегетации
Озимые/яровые зерновые культуры	Качество листьев, эффективность использования азота, жизнестойкость	1 - 3 раза 3 - 5 л/га	Со стадии 3-х листьев
Пастбища	Эффективность использования азота, повышение стрессоустойчивости, энергетической ценности	2 - 4 раза 3 - 5 л/га	В течение вегетационного периода
Картофель	Эффективность использования азота, повышение стрессоустойчивости, качество кожуры	1 - 3 раза 3 - 5 л/га	Начиная со стадии 6-ти листьев
Картофель	Качество листьев, урожайность, уровень фотосинтеза, жизнестойкость	1 - 2 раза 3 - 5 л/га	Сначала смыкания рядков

Культура	Цель/Проблема	Рекомендации	Время применения
Бобовые (включая сою)	Качество листьев, урожайность, уровень фотосинтеза, жизнестойкость	1 - 2 раза 3 - 5 л/га	Начиная со стадии 6-ти листьев
Бобовые (включая сою)	эффективность использования азота, повышение стрессоустойчивости, зимостойкость	1 - 2 раза 3 - 5 л/га	Начиная со стадии 6-ти листьев
Кукуруза	Качество листьев, урожайность, уровень фотосинтеза, жизнестойкость	1 - 2 раза 3 - 5 л/га	Начиная со стадии 4-х листьев
Кукуруза	Качество зерна, энергетическая ценность, энергоэффективность, повышение стрессоустойчивости	1 - 2 раза 3 - 5 л/га	Начиная со стадии 4-х листьев
Масличный рапс	Эффективность использования азота, повышение стрессоустойчивости	1 - 3 раза 3 - 5 л/га	Начиная со стадии 4-х листьев
Масличный рапс	Качество листьев, урожайность, уровень фотосинтеза, жизнестойкость	1 - 2 раза 3 - 5 л/га	Весной с начала вегетации и до начала цветения
Подсолнухи	Качество листьев, урожайность, уровень фотосинтеза, жизнестойкость	1 - 2 раза 3 - 5 л/га	Начиная со стадии 4-х листьев
Подсолнухи	Эффективность использования азота, повышение стрессоустойчивости	1 - 2 раза 3 - 5 л/га	Начиная со стадии 4-х листьев
Сахарная свекла	Качество листьев, урожайность, уровень фотосинтеза, жизнестойкость	1 - 2 раза 3 - 5 л/га	Начиная со стадии 6-ти листьев
Сахарная свекла	Эффективность использования азота, повышение стрессоустойчивости	1 - 3 раза 3 - 5 л/га	Начиная со стадии 6-ти листьев
Садовая земляника (клубника)	Для предотвращения преждевременного опадания листьев; повышенная жизнестойкость, качество листьев, уровень фотосинтеза	2 - 3 раза 3 - 5 л/га	С начала цветения и до урожая
Садовая земляника (клубника)	Эффективность использования азота, жизнестойкость, качество листьев	2 - 4 раза 3 - 5 л/га	Начиная с появления зеленых почек
Семечковые фрукты	Качество листьев, эффективность использования азота, жизнестойкость, против преждевременного опадения листьев	2 - 4 раза 3 - 5 л/га	Красные бутоны
Семечковые фрукты	Для предотвращения преждевременного опадания листьев; повышенная жизнестойкость, качество листьев, уровень фотосинтеза	2 - 4 раза 3 - 5 л/га	С конца цветения (только со стадии бутона размером с грецкий орех для сортов склонных к ржавчине)
Косточковые фрукты	Для предотвращения преждевременного опадания листьев; повышенная жизнестойкость, качество листьев, уровень фотосинтеза	2 - 3 раза 3 - 5 л/га	С момента завязи и до урожая
Косточковые фрукты	Для предотвращения преждевременного опадания листьев; повышенная жизнестойкость, качество листьев, уровень фотосинтеза	2 - 4 раза 3 - 5 л/га	С момента формирования завязей плодов
Кустарниковые ягоды	Для предотвращения преждевременного опадания листьев; повышенная жизнестойкость, качество листьев, уровень фотосинтеза	2 - 3 раза 3 - 5 л/га	С начала цветения и до урожая
Кустарниковые ягоды	Для предотвращения преждевременного опадания листьев; повышенная жизнестойкость, качество листьев, уровень фотосинтеза	2 - 4 раза 3 - 5 л/га	Начало роста побегов

Культура	Цель/Проблема	Рекомендации	Время применения
Столовый виноград	Качество листьев, эффективность использования азота, жизнестойкость, предупреждение увядания плодоножек	2 - 5 раз 3 - 5 л/га	С момента увеличения завязи
Столовый виноград	Качество листьев, уровень фотосинтеза, предотвращение усыхания ягод	2 - 5 раз 3 - 5 л/га	После цветения и до смыкания большинства ягод
Цитрусовые плоды	Эффективность использования азота, жизнестойкость, качество листьев	2 - 4 раза 3 - 5 л/га	С момента появления белых бутонов
Виноград винных сортов	Качество листвы, хлорофил, уровень фотосинтеза, профилактика увядания ягод	2 - 5 раз 3 - 5 л/га	После цветения и до смыкания большинства ягод
Виноград винных сортов	Качество листьев, эффективность использования азота, жизнестойкость, предупреждение увядания плодоножек	2 - 5 раз 3 - 5 л/га	С момента увеличения завязи
Медицинские растения, душистые растения, специи	Качество листьев, эффективность использования азота, повышение стрессоустойчивости	2 - 3 раза 3 - 5 л/га	После развития достотчного количества листвы
Медицинские растения, душистые растения, специи	Качество листьев, урожайность, уровень фотосинтеза, жизнестойкость	2 - 3 раза 3 - 5 л/га	После развития достотчного количества листвы
Общие овощи	Улучшение качества листьев, хлорофилл, жизнестойкость, уровень фотосинтеза	2 - 4 раза 3 - 5 л/га	После развития достотчного количества листвы
Общие овощи	Качество листьев, эффективность использования азота, повышение стрессоустойчивости	2 - 4 раза 3 - 5 л/га	После развития достотчного количества листвы
Хмель	Качество листьев, урожайность, уровень фотосинтеза, жизнестойкость	2 - 3 раза 3 - 5 л/га	С момента достижения растением высоты 0.5 м и до начала цветения
Хмель	Качество листьев, эффективность использования азота, повышение стрессоустойчивости	2 - 3 раза 3 - 5 л/га	С момента достижения высоты 0,5 м до сбора урожая
Табак	Качество листьев, урожайность, уровень фотосинтеза, жизнестойкость	2 - 3 раза 3 - 5 л/га	Начиная со стадии 4-х листьев
Табак	Качество листьев, эффективность использования азота, повышение стрессоустойчивости	1 - 3 раза 3 - 5 л/га	Начиная со стадии 4-х листьев
Рождественская ель	Предотвратить преждевременное опадание листьев; жизнестойкость, качество листьев, уровень фотосинтеза	2 - 3 раза 3 - 5 л/га	В течение вегетационного периода
Рождественская ель	Качество листьев, эффективность использования азота, жизнестойкость, против преждевременного падения игл	2 - 3 раза 3 - 5 л/га	С фазы появления почек
Декоративные растения	Качество листьев, жизнестойкость, уровень фотосинтеза	2 - 3 раза 1 л (на 100 л распрыскиваемой воды, 3 - 5 л/га)	При необходимости
Декоративные растения	Качество листьев, эффективность использования азота, повышение стрессоустойчивости	2 - 3 раза 1 л (на 100 л распрыскиваемой воды, 3 - 5 л/га)	При необходимости
Зелень	Качество листьев, жизнестойкость, уровень фотосинтеза	1 - 5 раз 3 - 5 л/га	В течение вегетационного периода
Зелень	Качество листьев, эффективность использования азота, повышение стрессоустойчивости	2 - 4 раза 3 - 5 л/га	В течение вегетационного периода
Орехи	Эффективность использования азота, жизнестойкость, качество листьев	2 - 4 раза 3 - 5 л/га	С момента формирования завязей плодов
Хлопчатник	Качество листьев, эффективность использования азота, повышение стрессоустойчивости	1 - 3 раза 3 - 5 л/га	С фазы появления почек

Культура	Цель/Проблема	Рекомендации	Время применения
Рис	Качество зерна, Эффективность использования азота, повышение стрессоустойчивости	1 - 3 раза 3 - 5 л/га	Со стадии 3-х листьев