

QuS



Информация о товаре

Лебозол®-Квадро С

Удобрение, соответствующее стандартам ЕС | Суспензия с содержанием меди (Cu), марганца (Mn), цинка (Zn) и серы (S)

ρ 1,66 | pH 7,0 - 8,0

Питательное вещество, массовая доля	г / л
4,8 % суммарная массовая доля меди (Cu) в виде гидроксид-хлорида меди	80
12,2 % суммарная массовая доля марганца (Mn) в виде оксида марганца	203
6 % суммарная массовая доля цинка (Zn) в виде оксида цинка	100
12 % Сера (S)	199
также содержит: 12 % Сера (200 г/л S)	

Культура	Цель/Проблема	Рекомендации	Время применения
На всех культурах	Для обеспечения питательными веществами марганцем, медью, цинком и серой	1 - 2 л/га (При внекорневой подкормке на минимум 200 л воды. При использовании ранцевого опрыскивателя 0.2%-й)	При необходимости
Озимые/яровые зерновые культуры	Содержание белка и качество зерна, урожайность, эффективность азота	1 - 1,5 л/га (рекомендация для озимых злаковых культур)	В фазу колошение
Озимые/яровые зерновые культуры	Кущение, урожайность, эффективность азота, стабильность	2 раза 1 - 1,5 л/га (рекомендация для яровых злаковых культур)	Со стадии 3-х листьев
Озимые/яровые зерновые культуры	Кущение, урожайность, эффективность азота, стабильность	1 - 1,5 л/га (рекомендация для озимых злаковых культур)	Весной с начала вегетации
Озимые/яровые зерновые культуры	Урожайность, Эффективность азота, уровень фотосинтеза, зимостойкость	1 - 1,5 л/га (рекомендация для озимых злаковых культур)	Осенью начиная со стадии 3-х листьев
Пастбища	Качество листьев, эффективность азота, уровень фотосинтеза, зимостойкость	2 - 5 раза 1 - 1,5 л/га	В течение вегетационного периода
Картофель	Качество кожуры, выносливость	1 - 2 раза 1 - 2 л/га	Сначала смыкания рядков
Бобовые (включая сою)	Уровень фотосинтеза, выносливость, зимостойкость	1 - 2 раза 1 - 1,5 л/га	Начиная со стадии 6-ти листьев
Кукуруза	Урожайность, уровень фотосинтеза, зимостойкость	2 л/га	Начиная со стадии 4-х листьев
Масличный рапс	Урожайность, уровень фотосинтеза, выносливость, зимостойкость	1 - 2 раза 1 л/га	Весной с начала вегетации и до начала цветения
Масличный рапс	Урожайность, уровень фотосинтеза, выносливость, зимостойкость	1 л/га	Осенью начиная со стадии 4-х листьев
Подсолнухи	Урожайность, уровень фотосинтеза, зимостойкость	1 л/га	Начиная со стадии 4-х листьев

Дополнительную информацию можно получить по горячей линии +49 (0) 63 28-9 84 94-80 или на нашей домашней странице www.lebosol.ru



Lebosol® Dünger GmbH | Wiesengasse 28 | 67471 Elmstein — Германия | +49 (0) 63 28/9 84 94-0 | info@lebosol.de | www.lebosol.ru

Культура	Цель/Проблема	Рекомендации	Время применения
Сахарная свекла	Урожайность, уровень фотосинтеза, зимостойкость	1 - 2 раза 1 л/га	Начиная со стадии 6-ти листьев
Медицинские растения, душистые растения, специи	Цвет листьев, качество, выносливость	1 - 2 раза 1 - 2 л/га	После развития достотчного количества листвы