S

MADE IN GERMANY

био перечислено

Информация о товаре

Лебозол®-Сера 800

Удобрение, соответствующее стандартам ЕС | Элементарная сера, жидкая форма

ρ 1,43 | pH 6,0 - 8,0

Питательное вещество, массовая доля	г / л
56 % Сера (S)	801

Культура	Цель/Проблема	Рекомендации	Время применения
На всех культурах	Для предотвращения и уменьшения дефицита серы	3 - 10 л/га (При внекорневой подкормке не менее 300 л воды. При нанесении с помощью ранцевого опрыскивателя — 0,2–1-процентный раствор)	При необходимости
	Эффективность фотосинтеза, повышение жизнестойкости, зимостойкость	1 - 3 раза 2 - 5 л/га	При необходимости
На всех культурах	Для снабжения серой, урожайности, устойчивости, эффективности использования азота, обеспечение сопротивляемости, вызванной серой, повышение эффективности фотосинтеза	2 - 10 л/га (При внекорневой подкормке не менее 300 л воды. При нанесении с помощью ранцевого опрыскивателя — 0,2–1-процентный раствор)	При необходимости
На всех культурах	Протравливание семян с использованием питательных веществ для улучшения развития растений на ранних фазах	0,2 - 0,4 l/ц	Совместно с протравителем семян
Озимые/яровые зерновые культуры	Содержание протеина и качество зерна, эффективность использования азота, зимостойкость	2 - 3 раза 3 - 5 л/га	Со стадии 3-х листьев
Озимые/яровые зерновые культуры	Урожайность, эффективность азота, улучшение сопротивляемости болезням	1 - 2 раза 3 - 5 л/га	Со стадии кущения
Озимые/яровые зерновые культуры	Содержание белка и качество зерна, урожайность, эффективность азота	1 - 2 раза 3 л/га	В фазу колошение
Пастбища	Урожайность, эффективность азота, жизнестойкость	2 - 5 раза 3 - 5 л/га	В течение вегетационного периода
Пастбища	Урожайность, эффективность использования азота, жизнестойкость, качество листьев, зимостойкость	2 - 4 раза 3 - 5 л/га	В течение вегетационного периода
Пастбища	Повышение сопротивляемости болезням	3 - 5 л/га	Осенью после последней обрезки
Картофель	Эффективность фотосинтеза, повышение жизнестойкости, качество листьев	2 - 4 раза 3 - 5 л/га	Начиная со стадии 6-ти листьев

Культура	Цель/Проблема	Рекомендации	Время применения
Картофель	Урожайность, эффективность азота, жизнестойкость, выносливость	1 - 3 раза 3 - 5 л/га	Сначала смыкания рядков
Бобовые (включая сою)	Урожайность, содержание белка	1 - 2 раза 3 - 5 л/га	Начиная со стадии 6-ти листьев
Бобовые (включая сою)	Качество зерна, содержание протеина, эффективность использования азота	1 - 2 раза 3 - 5 л/га	Начиная со стадии 6-ти листьев
Кукуруза	Качество зерна, содержание протеина, эффективность использования азота	1 - 2 раза 3 - 5 л/га	Начиная со стадии 4-х листьев
Кукуруза	Урожайность и жизнестойкость, микроэлементы	1 - 2 раза 3 - 5 л/га	Начиная со стадии 4-х листьев
Масличный рапс	Эффективность использования азота, содержание масла, качество листьев, зимостойкость	2 - 3 раза 5 - 10 л/га	Начиная со стадии 4-х листьев
Масличный рапс	Цветение, урожайность, содержание масла	1 - 2 раза 5 - 10 л/га	Начиная со стадии 6-ти листьев и до начала цветения
Подсолнухи	Эффективность использования азота, содержание масла, качество листьев	1 - 2 раза 3 - 5 л/га	Начиная со стадии 4-х листьев
Сахарная свекла	Качество листьев, эффективность азота, улучшение сопротивляемости болезням	2 - 3 раза 5 - 10 л/га	Начиная со стадии 6-ти листьев
Сахарная свекла	Качество листьев, эффективность азота, улучшение сопротивляемости болезням	1 - 2 раза 3 - 5 л/га	Начиная со стадии 6-ти листьев
Садовая земляника (клубника)	Качество листьев и плодов, улучшение сопротивляемости болезням	1 - 3 раза 2 - 4 л/га	Начиная с появления зеленых почек
Семечковые фрукты	Качество листьев и плодов, улучшение сопротивляемости болезням	1 - 3 раза 2 - 4 л/га	Начиная с фазы цветения и до июньского опадения плодов
Семечковые фрукты	Качество листьев и плодов, улучшение сопротивляемости болезням	1 - 3 раза 2 - 4 л/га	Красные бутоны
Косточковые фрукты	Качество листьев и плодов, улучшение сопротивляемости болезням	1 - 3 раза 2 - 4 л/га	С момента формирования завязей плодов
Кустарниковые ягоды	Качество листьев и плодов, улучшение сопротивляемости болезням	1 - 3 раза 2 - 4 л/га	Начало роста побегов
Столовый виноград	Качество листьев и плодов, улучшение сопротивляемости болезням	3 - 6 раза 3 - 4 л/га	С момента увеличения завязи
Столовый виноград	Качество листьев и плодов, улучшение сопротивляемости болезням	3 - 6 раза 3 - 4 л/га	Со стадии 3-х листьев и до момента смыкания большинства ягод
Цитрусовые плоды	Качество листьев и плодов, улучшение сопротивляемости болезням	1 - 3 раза 2 - 4 л/га	С момента появления белых бутонов
Виноград винных сортов	Качество листьев и плодов, улучшение сопротивляемости болезням	3 - 6 раза 3 - 4 л/га	Со стадии 3-х листьев и до момента смыкания большинства ягод
Виноград винных сортов	Качество листьев и плодов, улучшение сопротивляемости болезням	3 - 6 раза 3 - 4 л/га	С момента увеличения завязи
Медицинские растения, душистые растения, специи	Эффективность использования азота, содержание масла, качество листьев, внутреннее качество	2 - 5 раза 3 - 5 л/га	После развития достотчного количества листвы
Медицинские растения, душистые растения, специи	Оживление, улучшение фотосинтеза, выносливость, внутреннее качество	1 - 3 раза 3 - 4 л/га	После развития достотчного количества листвы

Культура	Цель/Проблема	Рекомендации	Время применения
Общие овощи	Эффективность использования азота, содержание масла, качество листьев, внутреннее качество	2 - 5 раза 3 - 5 л/га	После развития достотчного количества листвы
Общие овощи	Оживление, улучшение фотосинтеза, выносливость, внутреннее качество	1 - 4 раза 3 - 6 л/га	После развития достотчного количества листвы
Хмель	Оживление, улучшение фотосинтеза, выносливость, внутреннее качество	2 - 5 раза 3 - 5 л/га	С момента достижения высоты 0,5 м до сбора урожая
Хмель	Оживление, улучшение фотосинтеза, выносливость, внутреннее качество	3 - 5 раза 4 - 6 л/га	С момента достижения растением высоты 0.5 м и до начала цветения
Табак	Качество листьев, жизнестойкость, эффективность фотосинтеза	1 - 2 раза 3 - 5 л/га	Начиная со стадии 4-х листьев
Рождественская ель	Эффективность фотосинтеза, повышение жизнестойкости, зимостойкость	2 - 3 раза 3 - 5 л/га	С фазы появления почек
Рождественская ель	Оживление, уровень фотосинтеза, выносливость, эффективность азота, зимостойкость	2 - 4 раза 2 - 4 л/га	С фазы появления почек
Декоративные растения	Качество листьев, жизнестойкость	1 - 3 раза 2 - 3 л/га	При необходимости
Зелень	Эффективность фотосинтеза, повышение жизнестойкости, зимостойкость	2 - 5 раза 3 - 5 л/га	В течение вегетационного периода
Зелень	Оживление, уровень фотосинтеза, выносливость, эффективность азота, зимостойкость	2 - 5 раза 3 - 5 л/га	В течение вегетационного периода
Орехи	Качество листьев и плодов, улучшение сопротивляемости болезням	1 - 3 раза 2 - 4 л/га	С момента формирования завязей плодов
Хлопчатник	повышение жизнестойкости, качество листьев, зимостойкость	2 - 3 раза 3 - 5 л/га	Начиная со стадии 4-х листьев
Рис	Качество зерна, Эффективность использования азота, качество листьев	2 - 3 раза 3 - 5 л/га	Со стадии 3-х листьев

Lebosol® Dünger GmbH | Wiesengasse 28 | 67471 Elmstein — Германия | +49 (0) 63 28/9 84 94-0 | info@lebosol.de | www.lebosol.ru